

Broj:11/2021

Sarajevo, 05.07.2021. godine

Obavijest za proizvođače krompira

Na području Kantona Sarajevo usjevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja, zavisno od nadmorske visine. Ako se uzmu u obzir vremenske prilike, oborine koje su praćene temperaturom koja je povoljna za razvoj **plamenjače** na krompiru (*Phytophthora infestans*), kao i **crne pjegavosti** na krompiru (*Alternaria solani*), preporuka je da se nakon oborina što prije izvrši zaštita.

Ukoliko se usjevi nalaze u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti preporučujemo preparate preventivnog djelovanja kao što su: Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG, Mankozeb, Star 80, Pinkozeb M-45, Dithane DG Neotec, Polyram DF, Champion Flow SC, Bordovska juha caffaro 20 WP i dr.

Ukoliko su na krompiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemčnim fungicidima. U tom slučaju mogu se primjeniti neki od sljedećih fungicida: Ranman 400 SC, Proxanil 450 SC, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Revus, Equation PRO, Signal Super i dr.

Fungicidi koji djeluju na crnu **pjegavost** su: Ortiva, Signum, Difkor, Agro, Zafra Azt 250 SC i dr.

Fungicid koji djeluju na obje bolesti je: Signal Super.

Preparate obavezno koristiti u skladu s uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način. Svako tretiranje je potrebno evidentirati.