



Broj: 01/2022
Sarajevo, 16.03.2022.godine

Predmet: Obavjest za voćare-zimsko prskanje

Obavještavamo voćare da prate razvojni stadij pupova, kako bi u fazi bubrenja pupova izvršili prskanje primjenom bakarnih preparata. Kada se pupovi otvore, primjena bakarnih preparata može izazvati fitotoksičnost. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se mnogobrojne prezimjele forme štetnika kao što su: lisne, štitaste i krvave uši crveni pauk, razni savijači, kruškina buha, jabučni cvjetojed, šljivin moljac, a istovremeno se smanjuje pojava šupljikavosti i kovrdžavosti lista, bakterijski rak, kao i rogač šljive.

Obzirom da je došlo do znatnog porasta dnevnih temperatura, koje iznose i do 13° C, vegetacija će ubrzano krenuti i doć će do otvaranje pupa, a u narednih sedam dana očekuje se stabilno vrijeme bez padavina. Zato i preporučujemo da se izvrši zimski tretman.



Zimsko tretiranje se izvodi u vrijeme mirovanja odnosno pred kretanje vegetacije, čim vremenske prilike dozvole. Koštičavo voće, kao i malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom. **Tretiranje je najbolje obaviti kada su stabla voćaka suha i spoljna temperatura iznad 5-7° C, da bi se izbjeglo izmrzavanje.** Potrebno je da se voćke dobro oprskaju (takozvano kupanje) sa svih strana, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore.

Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra i mineralna ulja. Navodimo neke od preparata na bazi bakra :Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Neoram WG, Cuprablau-Z 35i dr. Preporučujemo da se koriste fabrički gotove kombinacije preparata na bazi bakra i mineralnih ulja.

**Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.
Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.**