

Obavjest za voćare

Obavještavamo voćare da prate razvojni stadij pupova, kako bi u fazi bubrežnja pupova izvršili prskanje primjenom bakarnih preparata. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se mnogobrojne prezimjele forme štetnika kao što su: lisne, štitaste i krvave uši, crveni pauk, razni savijači, kruškina buha, jabučni cvjetojed, šljivin moljac, a istovremeno se smanjuje pojava šupljikavost i kovrdžavost lista, bakterijski rak kao i rogač šljive.

Obzirom da je došlo do znatnog porasta temperatura, a najavljuju se i kišni dani što može dovesti do infekcija uzročnicima paleži cvjeta i sušenje izboja (*Monilia laxa*) kao i šupljikavost lista (*Stigmina carpophila*). Od preparata se mogu koristiti: Chorus 50 WG, Signum DF, Indar 5 EW i dr.



Zimsko tretiranje se izvodi u vrijeme mirovanja odnosno pred kretanje vegetacije, čim vremenske prilike dozvole. Koštičavo voće, kao i malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom. **Tretiranje je najbolje obaviti kada su stabla voćaka suha i spoljna temperatura iznad 5-7°C, da bi se izbjeglo izmrzavanje.** Potrebno je da se voćke dobro oprskaju sa svih strana, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore.

Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra i mineralna ulja. Navodimo neke od preparata na bazi bakra: Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Neoram WG, Kupropin, Cupro Cafaro 50 WP. Najbolje je koristiti gotove fabričke kombinacije bakra i mineralnog ulja kao što je Modro ulje.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.